

香菇多醣輔助治療中晚期消化道腫瘤

消化道腫瘤臨床症狀並不典型，常被誤為胃炎、胃潰瘍、消化不良、便秘等。比如胃癌早期無明顯症狀，部分患者有上腹部疼痛、不適或噁心、嘔吐等症狀，誤診當作胃炎或胃潰瘍診療後，症狀可暫時緩解，但短期內症狀反復發作。就診時已屬晚期，或者廣泛轉移，錯失根治機會。放化療為主的綜合治療成為延長患者生存期的常見手段。

北京解放軍 309 醫院腫瘤科廖國清等，對「香菇多醣注射液配合 FOLFOX4 方案治療中晚期消化道腫瘤的療效觀察」進行臨床研究。研究將 418 例**食道癌患者**隨機分為化療組 (包括胃癌 105 例，胃癌合併肺癌 10 例，食管癌 32 例，結腸癌 33 例，直腸癌 38 例)，和香菇多醣組 (包括胃癌 97 例，胃癌合併肺癌 6 例，食管癌 37 例，結腸癌 28 例，直腸癌 32 例)。其中



1. **化療組** 218 例 給予 FOLFOX4 化療，
2. **香菇多醣組** 200 例 香菇多醣聯合 FOLFOX4 化療

接受兩週期化療後，兩組結果有明顯統計學差異 ($p < 0.05$)。對比化療組，香菇多醣組

1. 總有效率為 45.9%，化療組為 38%
2. 身體一般狀況 (KPS 評分)，症狀和體徵 (ZPS 評分) 以及生活質量 (QOL 評分) 明顯改善
3. 免疫功能上調，T 細胞亞群 CD3、CD4、CD4/CD8 明顯改善

結論

香菇多醣聯合化療中晚期消化道腫瘤，有效提高治療率，緩解副作用，提升患者免疫細胞功能，改善生活質量。



資料來源:

廖國清，劉鵬輝等

香菇多醣注射液配合 FOLFOX4 方案治療中晚期消化道腫瘤的療效觀察