

香菇多醣聯合化療治療早期卵巢癌

卵巢癌是香港女性十大癌症中發病率排行第六，常見下腹部胞中有結塊，出現痛、脹、滿等感覺，甚至有出血的表現。化療是治療卵巢癌的主要手段。由於卵巢深入骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，發現時腫瘤細胞經常出現轉移和浸潤，需加大用藥劑量，增加正常組織受損的可能性。患者的生活質量明顯下降，病情在短時間內進一步惡化，並出現反復現象。

湖北醫藥學院附屬襄陽醫院腫瘤科梁素美等，分析「香菇多醣聯合化療治療早期卵巢癌臨床療效」，將2010年10月至2012年10月84例早期卵巢癌患者，隨機分為兩組，各42例。比較兩組患者在年齡、患病時間、婚姻狀況、生育情況等方面，差異無統計學意義 ($p > 0.05$)，具有可比性。


1. 對照組 採用常規化療方式
2. 香菇多醣組 在對照組化療基礎上，併用香菇多醣

比較臨床療效，所有差異均有統計學意義 ($p < 0.05$)

1. 病情控制率 對照組為 66.7%；香菇多醣組為 88.1%
2. 病情控制時間 對照組為 16.3天；香菇多醣組為 10.8天
3. 總治療時間 對照組為 21.4天；香菇多醣組為 15.9天
4. 六分鐘步行距離 6MWD 對照組為 26.5米；香菇多醣組為 30.3米

結論：

香菇多醣聯合化療有效控制病情，縮短治療時間，提高 6MWD，比單純化療有效。



資料來源：

梁素美, 龔星等

香菇多醣聯合化療治療早期卵巢癌臨床療效分析

國際中醫中藥雜誌 2013年 12月 第35卷 第12期