

香菇多醣輔助治療小細胞肺癌

小細胞肺癌 Small Cell Lung Cancer，SCLC 是一種未分化、惡性程度極高的神經內分泌腫瘤。小細胞肺癌因



1. 遲發現超過 6 成病患確診時，已到擴散期，不適合手術治療
2. 惡化快癌細胞分裂快速，30 天可以增加 1 倍
3. 易轉移容易轉移到腦部和骨頭，將近 5 成患者有腦轉移現象
4. 易復發快速產生抗藥性，大部分患者在 12 個月內復發

四大特點，臨床上治療較難，生存率較低，一直是困擾臨床醫生的重要問題。

小細胞肺癌分為**局限期**及**廣泛期**。前者代表癌細胞局限在一片肺葉內，或同時擴散至鄰近的淋巴結；後者代表癌細胞擴散到肺部以外、胸腔其他範圍，以致身體其他部位。

香菇多醣在中國和日本醫學界，廣泛應用於多種惡性腫瘤治療。臨床證實**香菇多醣**可提高「**非小細胞肺癌**」患者的化療敏感性，同時減少不良反應。湖南省腦科醫院何東等，進行「**香菇多醣治療小細胞肺癌近遠期療效觀察**」的研究。探討香菇多醣治療小細胞肺癌的應用價值。將 49 例小細胞肺癌患者分為 (A) 香菇多醣組 (26 例，採用 EP 方案化療 + 香菇多醣) 和 (B) 對照組 (23 例，採用 EP 方案化療)，2 組患者均接受治療 4 個週期。研究結論，比較對照組，香菇多醣組患者

1. 部分緩解率和總有效率顯著高於對照組
2. 1~3 年生存率及中位生存時間均高於對照組
3. 生存質量明顯優於對照組
4. 不良反應發生率低於對照組



資料來源:

何東，李晶晶，陳志釗

香菇多醣治療小細胞肺癌近遠期療效觀察

《淮海醫藥》2015年11月第33卷第6期